

พิษสุนัขบ้าคืออะไร

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคที่ติดเชื้ในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Rabies virus โดยสามารถเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกันได้โดย

การถูกสัตว์ที่มีเชื้อ ไวรัสเรบิลส์ กัด ข่วน เลีย บริเวณที่มีบาดแผล



อาการของสัตว์ที่ติดเชื้จะมีอาการอย่างไรนะ?



ระยะเริ่มแรก

มีอาการประมาณ 2-3 วัน โดยสุนัขจะมีอารมณ์และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น หลบซุกตัวเงิบหงุดหงิด ม่านตาขยาย กินน้อยลง

ระยะตื่นเต้น (ส่วนมาก)



เริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น ก้าวร้าว กัดสิ่งของไม่เลือก กินของที่ไม่สามารถกินได้ เช่น หิน กิ่งไม้ แต่บางตัวอาจจะไม่มีระยะนี้และเข้าสู่ระยะอัมพาตเลย

ระยะอัมพาต

ระยะอัมพาต ขาอ่อนแรง น้ำลายฟูมปาก ทรงตัวไม่ได้ ล้มลงแล้วลุกขึ้นไม่ได้ อัมพาตขึ้นทั่วตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด



ล้างแผล



โดยเปิดน้ำไหลผ่านแผล และ ฟอกสบู่หลายๆครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที

ใส่ยา

เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน

กักหมา

เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน

หาหมอ

เพื่อรักษาและฉีดวัคซีนตามกำหนด



อาการการของโรคพิษสุนัขบ้าในคน

ระยะเริ่มต้น



มีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ เบื่ออาหารปวดเมื่อยตามตัว หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน กระวนกระวาย

ระยะตื่นเต้น (ส่วนมาก)



ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน ก้าวร้าว อยู่ไม่นิ่ง กลืนลำบาก รวมถึงกลัวน้ำ ผู้ป่วยอาจมีอาการชัก มีน้ำลายฟูมปาก เป็นตะคริวตามข้อต่อต่างๆ

ระยะท้าย



ผู้ป่วยอาจมีภาวะการหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น โคม่า และ เสียชีวิตในที่สุด

หยุดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยหลัก 5ย.



อย่าแหยมให้สัตว์โมโห



อย่าเหยียบหาง หัว ขา ตัว หรือทำให้สัตว์ตกใจ



อย่าแยกสัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่า



อย่าหยิบอาหาร, ของเล่นสัตว์ ขณะสัตว์กินหรือเล่น



อย่ายุ่งกับสุนัขแม่ลูกอ่อน ในขณะที่แม่อยู่ด้วยกันกับลูก

อาหาร, ของเล่นสัตว์ ขณะสัตว์กินหรือเล่น กับสุนัขแม่ลูกอ่อน ในขณะที่แม่อยู่ด้วยกันกับลูก